

TIROCINIO 4

- 1) Cosa è necessario monitorare nell'ittero grave da malattia emolitica del neonato ?
 - A. TRANSAMINASI
 - B. BILIRUBINA
 - C. PROTIDEMIA
 - D. Tutte le precedenti
- 2) L'ipotiroidismo nel neonato non trattato precocemente determina l'insorgenza di :
 - A. CRETISMO
 - B. INFEZIONI RICORRENTI
 - C. IPERTERMIA
 - D. Nessuna delle precedenti
- 3) La statura media del neonato è:
 - A. 35cm
 - B. 40cm
 - C. 50cm
 - D. Nessuna delle precedenti
- 4) La frequenza respiratoria di un neonato è:
 - A. 30-33 atti al minuto
 - B. 40-45 atti al minuto
 - C. 50-55 atti al minuto
 - D. A+b
- 5) In un neonato di basso peso è necessario:
 - A. un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia
 - B. un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo
 - C. un monitoraggio continuo della temperatura
 - D. tutte le precedenti
- 6) Un neonato con atresia biliare presenta:
 - A. urine ipocromiche
 - B. feci ipocoliche e/o acoliche
 - C. urine ipocoliche
 - D. a+b
- 7) Le complicanze più frequenti dell'iperpiressia nei bambini piccoli sono :
 - A. convulsioni
 - B. encefalite

- C. epilessia
 - D. b+c
- 8) Uno dei seguenti esami deve essere effettuato sul cordone ombelicale di ogni neonato. Quale?
- A. Test di Coombs indiretto, fattore Rh, glicemia
 - B. Gruppo sanguigno con fattore Rh e test di Coombs diretto
 - C. Fenilchetonuria, test di Coombs diretto, glicemia
 - D. Nessuna delle precedenti
- 9) La tecnica di alimentazione che viene maggiormente utilizzata quando il neonato non è in grado di assumere latte è:
- A. la nutrizione parenterale
 - B. l'infusione endovenosa
 - C. il gavage
 - D. a+b
- 10) Il segno più precoce dell'occlusione intestinale neonatale è:
- A. il vomito
 - B. l'emissione di meconio verdastro
 - C. lo squilibrio idroelettrolitico
 - D. nessuna delle precedenti
- 11) Individuare il materiale NON necessario per l'intubazione tracheale del neonato:
- A. laringoscopio con lame rette e curve di misure diverse
 - B. la pinza di Magill di misura opportuna
 - C. soluzione fisiologica
 - D. a+b
- 12) Se dopo le 24 ore dalla nascita il neonato non ha emesso meconio occorre:
- A. somministrare, su prescrizione del medico farmaci per favorire la peristalsi
 - B. eseguire, su prescrizione del medico un microclisma evacuativo per facilitare l'emissione delle feci
 - C. eseguire un sondaggio rettale con sonda di gomma per escludere la presenza di atresia anale
 - D. a+b+c
- 13) Il riflesso di suzione nel neonato può essere stimolato toccando:
- A. il palato molle o il faringe posteriore
 - B. leggermente la punta del naso con un rapido movimento verso l'alto
 - C. la cute della guancia o dell'angolo della rima buccale
 - D. tutte le precedenti
- 14) Nel lattante si deve praticare la ventilazione :

A. Bocca-bocca-naso

B. Bocca-bocca in iperestensione

C. Bocca-naso in iperestensione

D. Nessuna delle precedenti

15) In un neonato con distress respiratorio si osserva:

A. aumento della frequenza respiratoria

B. vomito e irregolarità dell'alvo

C. acidosi metabolica

D. b+c

16) L'unico intervento preventivo di provata efficacia per ridurre il rischio della Sudden Infant Death Syndrome è:

A. posticipare al 6° mese la somministrazione delle vaccinazioni

B. mettere il bambino in posizione supina per farlo riposare

C. mettere il bambino in posizione prona per il sonno

D. b+a

17) La valutazione del punteggio di Apgar NON misura :

A. il colorito

B. lo sforzo respiratorio

C. la temperatura corporea

D. tutte le precedenti

18) Il fabbisogno proteico giornaliero nei bambini nei primi mesi di vita è circa:

A. 1 gr/Kg

B. 2gr/Kg

C. 4gr/Kg

D. 5gr7Kg

19) L'incidenza delle cardiopatie congenite nati vivi è di circa:

A. 0,5%

B. 1%

C. 2%

D. 5%

20) Il deficit di surfactante alveolare provoca:

A. sindrome da polmone umido

B. malattia delle membrane ialine polmonari

C. sindrome da aspirazione massiva di meconio

D. nessuna delle precedenti

21) Nel caso dell'onfalocele al momento della nascita l'addome del neonato deve essere subito ricoperto :

A. da cotone bagnato con acqua

B. da garze sterili imbevute di soluzione fisiologica tiepida e bendaggio occlusivo

C. da garze sterili imbevute di soluzione iodata

D. b+c+a

22) L'ernia ombelicale del bambino:

A. è quasi sempre associata con ernia inguinale

B. può essere evidente anche soltanto durante il pianto

C. tende ad incarcerarsi più di quella inguinale

D. nessuna delle precedenti

23) In bambini affetti da sindrome di Down hanno un rischio 14 volte superiore ai bambini non affetti da tale sindrome di avere:

A. un astrocitoma

B. una leucemia acuta

C. un tumore di Wilms

D. nessuna delle precedenti

24) Una manifestazione eczematosa è tipica di un bambino affetto da :

A. malattia di Kawasaki

B. malattia di Chron

C. sindrome di Wiskott-Aldrich

D. tutte le precedenti

25) Il periodo neonatale va:

A. dal 1° al 28° giorno di vita

B. dal 1° al 5° giorno di vita

C. dalla 1 alla 24 ora di vita

D. il periodo è variabile

26) Nell'attribuzione del punteggio di Apgar non viene preso in considerazione:

A. il colorito cutaneo

B. il riflesso pupillare

C. la reattività

D. tutte le precedenti

27) La pinza di Magill, in caso di intubazione di un neonato serve a :

A. guidare il tubo endotracheale tra le corde vocali

B. arrestare una emorragia faringea

C. rimuovere la cannula di Mayo

D. b+c

28) Tra le caratteristiche indicate quale non è una componente dell'indice di Apgar:

A. la temperatura corporea

B. Tono muscolare

C. Il colorito

D. B+c

29) Cosa si intende per Onfalocele?

A. Difetto di circolazione dovute alle anomalie della forma del cordone ombelicale

B. Aplasia della parete addominale nella regione ombelicale

C. Anomalia di chiusura del sacco erniario

D. B+c

30) In quale delle seguenti condizioni è presente l'assistenza del neonatologo in sala parto ?

A. Sofferenza fetale acuta

B. Distocia di spalla

C. In entrambe le precedenti ipotesi

D. Nessuna delle precedenti

31) Cosa si intende per Acrocianosi ?

A. Disturbo circolatorio cronico che colpisce l'estremità degli arti

B. Colorazione violacea della zona temporale

C. Tutte le precedenti

D. Nessuna delle precedenti

32) I gemelli "pigopagi" presentano la connessione patologica a livello:

A. del torace

B. della spalla

C. del sacro

D. del ginocchio

33) Con il termine Kernicterus viene identificata una patologia neonatale dovuta all'accumulo di :

A. pigmento biliare

B. meconio

C. vitamine

D. bilirubina

34) Cosa significa SIDS ?

A. Systematic infant death syndrome

B. Sudden infantilly death syndrome

C. Sudden infant death syndrome

D. Nessuna delle precedenti

35) La patologia nota spina bifida è conosciuta anche con il nome di:

A. meningomielocele

B. meningite

- C. meningocelite
- D. tutte le precedenti

36) Il periodo detto prima infanzia va da:

- A. 10 mesi a 2 anni di vita
- B. Fino a 2 anni di vita**
- C. Fino a 6 anni di vita
- D. Fino a 12 anni di vita

37) Solitamente l'ittero fisiologico rientra entro :

- A. 7-10 giorni**
- B. 3 giorni
- C. 5-10 giorni
- D. 3-28 giorni

38) Un neonato che presenta alla nascita una respirazione caratterizzata da inspirazioni profonde ed espirazioni rapide e gementi manifesta il respiro di :

- A. Kussumaul**
- B. Grocco
- C. Biot
- D. Nessuna delle precedenti

39) Un neonato che alla nascita presenta una respirazione caratterizzata da apnea intercalati a dispnea manifesta il respiro di :

- A. kussumaul
- B. Biot**
- C. Grocco
- D. Nessuna delle precedenti

40) La manifestazione del respiro dissociato di Grocco , in un neonato a termine può avere come possibile causa:

- A. intossicazione**
- B. tumori
- C. encefalopatie
- D. epatite

41) Quali sono le manifestazioni cliniche dell'infezione da HSV peri e post natali?

- A. Infezioni del SNC con o senza lesioni cutanee
- B. Infezioni limitate a pelle, occhi e bocca
- C. Tutte le precedenti**
- D. Nessuna delle precedenti

42) Cosa può provocare la somministrazione di petidina?

- A. Cefalea materna
- B. Depressione respiratoria del neonato**

C. Tutte le precedenti

D. A+c

43) I criteri biochimici per definire un evento asfittico acuto intrapartum sono:

A. $\text{PH} < 7.10$ e deficit di basi $> 10\text{mmol/L}$

B. $\text{PH} < 7.10$ e deficit di basi $> 12\text{mmol/L}$

C. $\text{PH} < 7.10$ e deficit di basi $> 11\text{mmol/L}$

D. Nessuna delle precedenti

44) Qual è la complicanza più frequente del neonato in caso di presentazione di faccia, mento anteriore ?

A. Periventricolare

B. Paralisi del nervo facciale

C. Edema laringeo

D. Edema diffuso

45) Quale tra queste patologie neonatali non è associata ad infezioni da rubeovirus in gravidanza?

A. Cecità

B. Focomelia

C. Sordità

D. polidattilia

46) Per la diagnosi di anemia falciforme del feto scegliere il miglior test di screening genetico per la sua individuazione:

A. coltura delle cellule del liquido amniotico

B. campione di sangue fetale

C. alfafetoproteina del liquido amniotico

D. b+a

47) Indicare qual è la causa di alti livelli materni di alfa fetoproteina alla 17 settimana di gestazione:

A. sindrome di down

B. anencefalia

C. focomelia

D. b+a

48) L'ambiguità genitale nei bambini è dovuta a:

A. disgenesia gonadica

B. la sindrome adrenogenitale

C. femminizzazione testicolare

D. b+a

49) Qual è il sito più importante di emopoiesi all'ottavo mese di gestazione ?

A. Sacco vitellino

- B. Milza
- C. fegato
- D. Midollo osseo**

50) Quale sostanza assunta dalla madre in gravidanza è associata ad anomalie fetali neonatali di disgregazione vascolare ?

- A. Tabacco
- B. Alcool
- C. vitamine
- D. Cocaina**

51) Tutti i seguenti farmaci sono associati ad anomalie fetali congenite, tranne uno, quale?

- A. Tetraciclina
- B. Litio
- C. potassio
- D. Sulfonamidi**

52) Quale delle seguenti opzioni non è una componente dell'indice di Apgar ?

- A. Colore della cute
- B. Tono muscolare
- C. rattività
- D. Temperatura corporea**

53) Quali delle seguenti condizioni è frequentemente associata all'oligodramnios?

- A. Agnesia renale**
- B. Atresia duodenale
- C. Tutte le precedenti
- D. Idrope fetale

54) Quali tra i seguenti segni è caratteristico della sindrome di Claude-Bernard-Horner?

- A. Midriasi, enoftalmo, ptosi palpebrale
- B. Miosi, esoftalmo, ptosi
- C. A+b
- D. Miosi, enoftalmo, ptosi palpebrale**

55) Indicare la percentuale di neonati che necessitano, alla nascita, di forme di assistenza per l'inizio della respirazione autonoma

- A. 20%
- B. 2%
- C. 5%
- D. 10%**

- 56) Indicare la via di somministrazione più agile e veloce per i neonati nelle prime ore di vita:
- A. incannulamento vena ombelicale
 - B. sottocutanea
 - C. rettale
 - D. tutte le precedenti
- 57) Indicare quale indice di Apgar dà inizio ad una rianimazione neonatale:
- A. Apgar <3 al 1° minuto
 - B. Apgar <5
 - C. Apgar <8
 - D. l'Apgar non è utilizzato per decidere la rianimazione
- 58) L'aspirazione delle vie aeree viene attuata con una pressione negativa:
- A. non superiore a 100 mmHg
 - B. non inferiore a 50 mmHg
 - C. tutte le precedenti
 - D. nessuna delle precedenti
- 59) Il rapporto tra compressioni e ventilazioni nel neonato è:
- A. 3:1 90 compressioni e 30 atti respiratori
 - B. Le compressioni devono essere continue
 - C. 2:1 20 compressioni e 10 atti respiratori
 - D. B+c
- 60) Tutte le seguenti condizioni possono essere associate ad una storia di ileo da meconio nel neonato eccetto:
- A. poliposi nasale
 - B. ipertensione sistemica
 - C. diminuita fertilità in età adulta
 - D. c+a
- 61) Indicare l'affermazione errata sulla vitamina k:
- A. il suo deficit nel neonato può causare emorragie
 - B. la sua fonte maggiore è rappresentata dai grassi
 - C. la sua produzione da parte dei batteri intestinali di solito soddisfa il fabbisogno
 - D. nessuna delle precedenti
- 62) I neonati alimentati esclusivamente con latte di capra possono andare incontro a carenza nutrizionale di:
- A. vitamina A
 - B. vitamina E
 - C. a+d

D. folati

63) Com'è anche detta la fontanella anteriore?

- A. bregmatica
- B. Grande fontanella
- C. A+d

D. Lambdoidea

64) Indicare il periodo entro il quale la fontanella anteriore si chiude:

- A. 2 anni di vita
- B. C+d
- C. 3 anni di vita

D. 1 anno di vita

65) Indicare il periodo entro il quale la fontanella posteriore si chiude:

- A. 6mesi di vita
- B. 8 mesi di vita
- C. 12 mesi di vita

D. 2 mesi di vita

66) Cos'è il riflesso di moro ?

- A. Stimolo di chiusura delle mani a pugno
- B. Rotazione della testa se si stimola un angolo delle bocca
- C. A+b

D. Reazione di soprassalto accompagnata da improvvisa apertura delle braccia

67) In base alla classificazione del peso della nascita, i neonati definiti LBW hanno un peso compreso:

- A. tra 2550 e 4199
- B. tra1500 e2499**
- C. tra 1000 e 1499
- D. tra 1700 e 3500

68) Se un neonato alla nascita è classificato come AGA vuol dire che ha:

- A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale**
- B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
- C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
- D. nessuna delle precedenti

69) Se un neonato alla nascita è definito SGA vuol dire che ha:

- A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
- B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
- C. d+a

D. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale

70) Se un neonato è definito alla nascita LGA vuol dire che ha:

A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale

B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale

C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale

D. tutte le precedenti

71) Il "fluor neonatorum" è un elemento caratteristico :

A. della crisi genitale femminile

B. della crisi genitale maschile

C. di entrambi i sessi

D. non riguarda i neonati

72) Dopo le prime 12 ore di vita del neonato, la frequenza cardiaca a riposo è:

A. <60 bpm

B. >60 bpm

C. compresa tra 60-80bpm

D. <80

73) La vernice caseosa è formata da :

A. secrezione sebacea

B. detriti cellule epidermiche

C. a+b

D. tutte le precedenti

74) Quali delle seguenti fontanelle in un neonato a termine è chiusa?

A. Asterica

B. A+c

C. Pterica

D. Tutte le precedenti

75) Il termine "craniosinostosi" indica:

A. la permanenza dell'apertura della fontanella

B. la saldatura precoce delle suture craniche

C. tutte le precedenti

D. nessuna delle precedenti

76) Il neonato pretermine presenta problemi di termoregolazione con tendenza all'ipotermia. Quale tra le seguenti sono alcune delle cause ?

A. Immaturità dei meccanismi di termoregolazione

B. Difetto di termogenesi ed eccessiva termodispersione

C. A+b

D. Tutte le precedenti

77) La frequenza in un neonato pretermine è di :

A. 35-45 bpm

B. 40-60 bpm

- C. 20-40 bpm
- D. 50-100 bpm

- 78) Nei neonato pretermine la malattia delle membrane ialine polmonari, riconosce come fattore eziopatogenetico più importante:
- A. nessuna delle successive
 - B. deficit numerico dei pneumociti di tipo I
 - C. mancanza del surfactante
 - D. mancanza dei pneumociti di II tipo
- 79) A quale delle seguenti patologie cerebrali può andare in contro un neonato pretermine di peso inferiore a 1500 g per le caratteristiche anatomo funzionale del proprio sistema nervoso centrale ?
- A. Emorragia peri-intraventricolare
 - B. Leucomalcia periventricolare
 - C. Tutte le precedenti
 - D. Nessuna delle precedenti
- 80) La limitazione delle capacità digestive, assorbitive e metaboliche del neonato pretermine sono dovute a:
- A. ridotta capacità gastrica
 - B. ridotta capacità gastrica e assorbitiva
 - C. tutte le precedenti
 - D. nessuna delle precedenti
- 81) Quali delle seguenti anomalie comportamentali presentano nei primi mesi di vita i neonati pretermine?
- A. Eccessiva irritabilità e irregolarità del sonno
 - B. Ridotta acquisizione dei processi interattivi
 - C. Tutte le precedenti
 - D. Nessuna delle precedenti
- 82) La retinopatia del neonato pretermine:
- A. è un disordine della vascolarizzazione retinica
 - B. porta sempre cecità
 - C. non è una malattia evolutiva
 - D. è una malattia incompatibile con la vita
- 83) Nel piede supinato:
- A. la volta plantare è spinata
 - B. la pianta del piede guarda verso l'interno
 - C. la pianta del piede guarda verso l'esterno
 - D. b+c
- 84) Il piede talo:

- A. è detto anche piede piatto
- B. Presenta una flessione dorsale
- C. presenta una flessione planare
- D. b+a

85) Nel piede valgo:

- A. vi è la flessione dorsale
- B. il tallone guarda fuori
- C. il tallone guarda dentro
- D. tutte le precedenti

86) Il termine clinodattilia indica:

- A. presenza di dita soprannumerarie
- B. fusione di più dita
- C. a+b+c
- D. deviazioni laterali di una o più falangi

87) l'allattamento al seno non è controindicato se la madre sta assumendo:

- A. Metronidazolo
- B. acetilcolina
- C. tiouracile
- D. cefalosporine

88) Un litro di latte materno contiene:

- A. 900-1000 calorie
- B. Non contiene calorie
- C. 100-500 calorie
- D. 700-750 calorie

89) Il metodo più accurato per la diagnosi di intolleranza alle proteine del latte vaccino nel lattante è :

- A. dosaggio IgE specifiche
- B. dosaggio IgA
- C. risposta alla dieta alimentare
- D. ricerca del sangue occulto fetale

90) Indicare l'affermazione non corretta riguardante l'allergia al latte vaccino:

- A. buona norma eliminare dalla dieta le proteine del latte vaccino sulla base della sola positività dei prick test, in assenza di sintomatologia clinica
- B. la diagnosi si basa sulla dimostrazione della dipendenza dei sintomi dalla presenza delle proteine del latte vaccino nella dieta
- C. la diagnosi di laboratorio non può sostituirsi alla clinica
- D. nessuna delle precedenti

91) la massima incidenza di allergia alle proteine del latte vaccino si ha:

A. dopo il primo anno di vita

B. nel primo anno di vita

C. nel secondo anno di vita

D. durante il terzo anno di vita

92) La doppia pesata del lattante, prima e dopo la poppata al seno, è una procedura:

A. da consigliare sempre

B. alla quale ricorrere solo qualche volta, in presenza di motivi fondati

C. del tutto priva di utilità

D. non ha alcun valore

93) Indicare l'affermazione non corretta riguardante il colostro:

A. è più ricco di proteine del latte maturo

B. è privo di grassi e proteine

C. è più ricco di grassi del latte maturo

D. è più ricco di vitamina A rispetto al latte maturo

94) Secondo UNICEF-OMS per l'allattamento al seno è necessario la definizione di:

A. un protocollo scritto e definito

B. solo un'informazione al personale

C. tutte le precedenti

D. nessuna delle precedenti

95) Quale delle seguenti indicazioni non fa parte del decalogo "i dieci passi UNICEF-OMS per l'allattamento al seno"?

A. Mostrare alle madri come allattare

B. A+c

C. Incoraggiare l'allattamento al seno

D. Informare tutte le donne in gravidanza degli svantaggi dell'allattamento al seno

96) Secondo il decalogo UNICEF-OMS per l'allattamento al seno è necessario:

A. mostrare alle madri come si allatta

B. mostrare alle madri come mantenere la secrezione lattea

C. tutte le precedenti

D. nessuna delle precedenti

97) Il decalogo UNICEF-OMS per l'allattamento al seno consiglia:

A. di mettere in contatto pelle a pelle il neonato con la mamma entro un'ora dalla nascita

B. di mettere in contatto pelle a pelle il neonato con la mamma immediatamente dopo la nascita

C. non indica tempi entro i quali è consigliato l'inizio del contatto pelle a pelle

D. b+c

98) Secondo il decalogo UNICEF-OMS per l'allattamento al seno, la preparazione del personale deve rivolgersi:

A. solo alle ostetriche ed ai ginecologo

B. solo alle ostetriche

C. solo agli infermieri

D. a tutto il personale

99) Quale posizione è indicata per allattare ?

A. Seduta

B. Di lato

C. Straiata

D. Secondo la comodità materna

100) Durante l'allattamento la testa, le spalle e l'anca del neonato devono essere:

A. sullo stesso asse

B. appoggiati ad un cuscino

C. nessuna delle precedenti

D. sono tutte vere

101) Qual è l'arco di tempo definito periodo neonatale ?

A. dalla nascita a 30 giorni completi di vita

B. dalla nascita a 28 giorni completi di vita

C. dalla nascita a 21 giorni di vita

D. nessuna delle precedenti

102) In caso di shock settico post-cesareo quali tra questi patogeni vengono interessati nel 50% dei casi ?

A. escherichia coly

B. klebsiella

C. stafilococco aureo

D. streptococco

103) La frequenza cardiaca nei primi giorni del puerperio di solito è:

A. aumentata

B. diminuita

C. uguale a quella che esisteva in gravidanza

D. a+b

104) Si definisce "addome a tavola" un addome:

A. con superficie perfettamente piatta

B. un addome trattabile

C. con parte molto tonica e priva di adipe

D. dolente, teso, non trattabile

- 105) Che cosa è un galattocele ?
- A. prolasso dei dotti galattofori
 - B. cisti mammaria da ritenzione lattea
 - C. incapacità di allattare
 - D. la montata lattea
- 106) Qual è il principale patogeno che causa mastite nel periodo puerperale ?
- A. streptococco gruppo A
 - B. stafilococco aureo
 - C. streptococco viridans
 - D. a+c
- 107) L'infezione puerperale si manifesta comunemente con
- A. l'endometrite
 - B. la parametrite
 - C. la mastite
 - D. nessuna delle precedenti
- 108) Alla II settimana di un puerperio una giovane donna che allatta il bambino al seno mostra una tumefazione dolente alla mammella dx. La cute soprastante è calda e rossa febbre 39 gradi centigradi. Linfonodi sub-ascellari dx palpabili e dolenti. La diagnosi più probabile è:
- A. mastite acuta dx
 - B. ingorgo mammario
 - C. galattocele
 - D. nessuna delle precedenti
- 109) Durante il processo di involuzione le cellule miometriali :
- A. rimangono dello stesso volume per tutta la durata dell'involuzione
 - B. sono notevolmente aumentate
 - C. sono notevolmente ridotte
 - D. nessuna delle precedenti
- 110) Il P.I.F. è:
- A. un farmaco coadiuvante l'allattamento
 - B. un fattore inibente la sintesi di prolattina
 - C. nessuna delle precedenti
 - D. è una vitamina
- 111) In quale di queste situazioni sarà maggiore il rischio di isoimmunizzazione materno-fetale da fattore Rh ?
- A. madre plurigravida Rh- e feto Rh+
 - B. madre Rh+ e feto Rh-
 - C. madre Rh- e feto Rh-

D. non si verifica mai

112) La mastite rappresenta una delle infezioni più importanti del periodo puerperale. L'agente eziologico più frequentemente in causa è:

A. lo stafilococco aureo

B. streptococco piogenys

C. streptococco gruppo A

D. coccobacillo

113) Appena dopo il parto l'utero ha un peso di :

A. 2000 gr

B. 6000gr

C. 400 gr

D. 1000gr

114) Una puerpera che non allatta vedrà ricomparire il flusso mestruale dopo:

A. 15 giorni dalla data del parto

B. 3-4 settimane dalla data del parto

C. A+b+d

D. 6-8 settimane dalla data del parto

115) Indicare il range di tempo definito "puerperio"

A. dalla nascita a 4 settimane

B. c+d

C. dalla nascita a 6 settimane

D. dalla nascita a 10 settimane

116) Dopo quanto tempo dal parto l'utero riprende le dimensioni pregravidiche?

A. 6 settimane

B. 8 settimane

C. 10 settimane

D. 12 settimane

117) Quali delle seguenti opzioni non è un parametro da controllare nella sorveglianza post-partum?

A. Perdite ematiche

B. Temperatura corporea

C. Frequenza cardiaca

D. Nessuna delle precedenti

118) Da che epoca puerperale l'utero non è più palpabile a livello addominale ?

A. 10-12 giornata

B. 20-22 giornata

C. A+b

D. Resta palpabile fino a 4 settimane dal parto

- 119) Intorno a che giornata puerperale i lochi sono definiti cromosi ?
- A. Dopo la 5 giornata
 - B. Dopo la 10 giornata**
 - C. Sono sempre definiti cromosi
 - D. Tutte le precedenti
- 120) Qual è il tempo massimo di attesa per la minzione spontanea di una puerpera post-partum?
- A. 3 ore
 - B. 8 ore
 - C. 48 ore
 - D. 6 ore**
- 121) In quale delle seguenti condizioni l'allattamento al seno non è controindicato?
- A. HIV positivo
 - B. Tutte le successive
 - C. HCV positivo
 - D. Sifilide attiva non trattata
- 122) In quale delle seguenti condizioni si esegue un cateterismo vescicale estemporaneo ad una puerpera?
- A. Qualora non abbia minzionato spontaneamente entro 8 ore dal parto
 - B. Si esegue in ogni caso il cateterismo vescicale
 - C. Qualora non abbia minzionato spontaneamente entro le 3 ore dal parto
 - D. Qualora non abbia minzionato spontaneamente entro le 6 ore dal parto**
- 123) In cateterismo vescicale estemporaneo con controllo ecografico di ristagno post-minzionale, il residuo dovrebbe essere:
- A. inferiore a 100 ml**
 - B. uguale a 100 ml
 - C. maggiore di 100 ml
 - D. nessuna delle precedenti
- 124) Il cateterismo vescicale estemporaneo con controllo ecografico post-minzionale:
- A. deve essere effettuato a tutte le donne che non di un residuo < deve essere effettuato hanno minzionato entro le 10 ore dal parto
 - B. se il ristagno è > 100ml fino al raggiungimento 100 ml**
 - C. deve essere preferito sempre al cateterismo a permanenza
 - D. b+a
- 125) Nel 95% dei casi la mastite è rappresentata da quale patogeno ?
- A. Stafilococco piogenys
 - B. Stafilococco aureo**

- C. Nessuna delle precedenti
- D. klebsella

126) Indicare tra le seguenti l'opzione che differenzia l'ingorgo mammario della montata lattea:

- A. nella montata lattea c'è febbre
- B. nell'ingorgo mammario non fuoriesce latte dal capezzolo
- C. nell'ingorgo mammario non c'è febbre
- D. nessuna delle precedenti

127) Una donna di 27 anni in 3 giornata di puerperio presenta una mammella turgida, dolente, calda, tensione mammaria e apiressia. Quale di queste potrebbe essere la diagnosi?

- A. Ingorgo mammario
- B. Mastite
- C. galattocele
- D. Montata lattea

128) Indicare tra le seguenti le cause di ingorgo mammario:

- A. errata posizione del neonato durante le poppate
- B. limitazione frequenza e/o durata pasti
- C. a+b
- D. tutte le precedenti

129) Nell'ingorgo mammario la presenza di febbre è:

- A. maggiore di 38°
- B. inferiore a 38°
- C. Non c'è presenza di febbre
- D. Maggiore di 40°

130) Quali dei seguenti farmaci può essere utilizzato per il trattamento della sintomatologia dolorosa dovuta ad un ingorgo mammario?

- A. Ibuprofene
- B. Paracetamolo
- C. A+b
- D. Tutte le precedenti

131) Quali delle seguenti opzioni differenziano la mastite dall'ingorgo mammario ?

- A. Febbre >38,5°
- B. Sintomatologia generale
- C. A+b
- D. Tutte le precedenti

- 132) Una donna di 32 in VIII giornata puerperale, presenta una malattia eritematosa, dolente alla palpazione con una zona di indurimento rilevabile alla palpazione, inoltre presenza di febbre e brividi . quale delle seguenti opzioni potrebbe essere la diagnosi?
- A. Tutte le successive
 - B. Capo parto
 - C. Ingorgo mammario
 - D. Mastite**
- 133) A quale ormone è dovuto l'effetto contraccettivo dell'allattamento?
- A. Estrogeni
 - B. estradiolo
 - C. Prolattina**
 - D. Progesterone
- 134) Quale dei seguenti farmaci è indicato per il trattamento l'inibizione dell'allattamento?
- A. Amoxicillina
 - B. Acido folico
 - C. Vabergolina**
 - D. Acido borigo
- 135) Indicare quale dei seguenti farmaci è indicato per il trattamento farmacologico della mastite:
- A. amoxicillina/acido clavulanico**
 - B. amoxicillina
 - C. vancomicina
 - D. nessuna delle precedenti
- 136) Indicare il tempo definito "sorveglianza post-partum"?
- A. 150 minuti
 - B. 300 minuti
 - C. 120 minuti**
 - D. 240 minuti
- 137) Indicare il periodo approssimativo in cui i lochi, grazie alla loro caratteristica colorazione, vengono detti sierosi:
- A. dopo la 10 giornata
 - B. dopo la 20 giornata
 - C. 3-4 giornata**
 - D. 7-8 giornata
- 138) Un farmaco indicato con dicitura L5 è:

- A. Sconsigliabile
- B. Nessuna delle successive
- C. controindicato
- D. non classificabile

139) Quale classe Ig è predominante nel colostro materno?

- A. IgM
- B. IgE
- C. IgG
- D. IgA

140) In quale dei seguenti casi il rischio di isommunizzazione materno-fetale da Rh è maggiore?

- A. Madre Rh+ e padre Rh-
- B. Madre di gruppo Ab
- C. Madre plurigravida Rh+ e feto Rh-
- D. Madre plurigravida Rh- e feto Rh+

141) Si parla di impegno della parte presentata quando:

- A. la sua maggior circonferenza è passata oltre lo stretto medio
- B. a+c
- C. la sua maggior circonferenza è passata oltre lo stretto superiore
- D. la sua maggior circonferenza si sta confrontando con un determinato stretto di riferimento
(superiore,medio,inferiore)

142) Nel decorso clinico del parto si distingue il periodo :

- A. prodromico, dilatante, espulsivo, del secondamento
- B. prodromico, dilatante, espulsivo, del puerperio
- C. a+b+d
- D. dilatante, espulsivo, del secondamento, del puerperio

143) La paralisi di Erb-Duchenne si riscontra normalmente nei neonati in caso di :

- A. distocie di spalla
- B. rotazione posteriore
- C. nessuna delle precedenti
- D. distocie di spalla e presentazione podalica

144) La profilassi dell'isoimmunizzazione da Rh va attuata:

- A. entro le prime 24h dal parto
- B. entro le prime 12h dal parto
- C. entro le prime 48h dal parto
- D. entro le prime 72h dal parto

145) Nella presentazione di vertice qual è il diametro di impegno:

A. sottocipito bregmatico

B. occipito frontale

C. mento occipitale

D. a+b

146) Nella presentazione di Bregma qual è il diametro di impregno:

A. sottocipito bregmatico

B. occipito frontale

C. mento occipitale

D. a+b+c

147) Nella presentazione di fronte qual è il diametro di impegno:

A. sottocipito bregmatico

B. occipito frontale

C. a+b

D. mento occipitale

148) Nella presentazione di faccia qual è il diametro di impegno:

A. sottomento bregmatico

B. mento occipitale

C. occipito frontale

D. b+c

149) La manovra di MULLER viene attuata:

A. per il disimpegno delle spalle e delle braccia nel parto podalico

B. per il disimpegno della testa nel parto podalico

C. per il disimpegno delle spalle nel parto podalico

D. a+b+c

150) Quale delle seguenti alternative descrive il calendario di somministrazione del vaccino antipoliomelitico:

A. tre somministrazioni, al primo mese al quarto mese, e un richiamo al primo anno di vita del bambino

B. le successive sono tutte false

C. quattro somministrazioni: al terzo mese, al quinto mese, tra l'undicesimo e il tredicesimo mese e un richiamo al quinto sesto anno di vita del bambino

D. quattro somministrazioni: al terzo mese al quinto mese, tra l'undicesimo e il tredicesimo mese e un richiamo al secondo anno di vita del bambino.

151) Per enuresi notturna si intende:

A. La mancata emissione di urina durante la notte nel bambino di età compresa tra uno e tre anni

B. Una perdita involontaria e completa di urina durante il sonno in un'età compresa tra i cinque e i sei anni

- C. La sensazione di dolore dovuta a spasmi dell 'uretra che accompagna la minzione involontaria nel bambino di età compresa tra sei e diciotto mesi
- D. Nessuna delle precedenti

152) Quali delle seguenti scale viene utilizzata per la valutazione del rischio di lesioni da compressione nel bambino:

- A. Scala di OPS
- B. Indice di Apgar
- C. Scala di Wong-Waker
- D. Scala di Glamorgan**

153) Tra le seguenti alternative quale indica la terapia d'urgenza del croup di origine virale nel paziente pediatrico:

- A. Antibiotici per via endovenosa
- B. cortisone
- C. Aerosol con adrenalina**
- D. Antistaminico per via intramuscolare

154) Cos'è l'abasia:

- A. L'incapacità del bambino di stare in stazione eretta
- B. Una reazione paracadute
- C. A+b+c
- D. L'incapacità del bambino di camminare**

155) Il sito di delezione per la somministrazione intramuscolare di un farmaco ad un lattante è il muscolo:

- A. bicipite
- B. dorsogluteo
- C. sono tutte false
- D. rettofemorale**

156) Quale fra queste scale può essere utilizzata per la valutazione del dolore in un neonato:

- A. scala CHEOPS
- B. scala NIPS**
- C. scala VAS
- D. indice di Apgar

157) Nell' atresia delle vie biliari le feci del bambino sono:

- A. Picee
- B. C+d
- C. steatosiche
- D. biancastre**

158) Cosa caratterizza il riflesso di Moro in un neonato normale a termine:

- A. Sfiando le labbra o le guance del piccolo, questi gira la testa apre la bocca e muove la lingua verso l'oggetto con cui è venuto a contatto come se cercasse istintivamente il capezzolo o il biberon
- B. C+d
- C. Sostenuo sotto le ascelle , se a contatto con una superficie dura il bebè è in grado di flettere le gambe simulando una marcia automatica
- D. Abbassando improvvisamente il bambino che giace sulla schiena, egli percepisce la sensazione di cadere e reagisce stendendo le braccia e aprendo le dita

159) La tecnica della ventilazione liquida nel neonato consiste :

- A. Nell'utilizzo di fluidi inerti come i perfluoro carbonati con lo scopo principale di veicolare meglio l' O₂ e rimuovendo la CO₂
- B. Nell'utilizzo di fluidi ottenuti dalla miscela di soluzione fisiologica, surfactante e mucolitici con lo scopo di migliorare gli scambi gassosi , rimuovere le secrezioni polmonarie e mantenere pressioni positive continue negli alveoli
- C. A+b+d
- D. Nell'introdurre tramite broncoscopia liquidi a base di emocomponenti arricchiti di O₂

160) Il trattamento della atresia esofagea consiste

- A. Nella dieta semiliquida
- B. Nel trattamento chirurgico
- C. Nel frazionamento dei pasti
- D. A+b+c

161) L'ipospadia è:

- A. Un'alterazione congenita caratterizzata dall'anomala posizione del meato uretrale del pene
- B. Un'alterazione caratterizzata dal fatto che l'ultimo tratto dell'uretere è contenuto all'interno della parete vescicale
- C. Una malattia del glomerulo renale

162) L'alimentazione di un bambino celiaco è consentito l'utilizzo di farina:

- A. Frumento
- B. Grano duro
- C. orzo
- D. mais

163) Nell'assistenza ad un lattante affetto da bronchiolite è necessario:

- A. mantenere pervie le vie aeree, monitorare la funzione respiratoria e applicare il catetere vescicale per il monitoraggio della diuresi oraria
- B. c e d sono entrambe vere

C. mantenere pervie le vie aeree e monitorare il bilancio idrico e parametri vitali

D. mantenere pervie le vie aeree, monitorare la temperatura corporea e somministrare antibiotici ad ampio spettro

164) Quali delle seguenti alternative non indica uno dei principali problemi di un bambino con la spina bifida:

A. incontinenza urinaria

B. psoriasi

C. formazione fecalomi

D. deformità a carico degli arti

165) Nella valutazione di un neonato di madre diabetica è necessario:

A. monitorare ipoglicemia

B. monitorare il peso

C. monitorare variazioni equilibrio acido base

D. tutte le precedenti

166) Quali tra le seguenti non è una possibile causa di convulsioni nel neonato:

A. ipoglicemia

B. ipercalcemia

C. ipocalcemia

D. iperglicemia

167) Che cosa si intende per "atteggiamento fetale":

A. il rapporto che le diverse parti fetali hanno tra loro

B. il rapporto che il maggior asse fetale ha con il maggior asse della cavità uterina

C. il rapporto che l'organismo fetale ha con l'organismo materno

D. a+b+c

168) Un'improvvisa riduzione dei movimenti attivi fetali (MAF) nelle 24h è significativa di:

A. particolare tranquillità del feto

B. sono tutte vere

C. ridotto accrescimento fetale

D. sofferenza fetale

169) Il calo fisiologico del neonato è dovuto a :

A. scarsa alimentazione nei primi giorni di vita

B. emissione di urina e meconio

C. tutte le precedenti

D. nessuna delle precedenti

170) Dove si trova lo sbocco uretrale in un bambino affetto da ipospadia:

A. sulla superficie ventrale del pene

- B. sulla superficie dorsale
- C. all'apice del pene
- D. a+b+c

171) La malattia celiaca è una permanente intolleranza verso il :

- A. lattosio
- B. glutine
- C. saccarosio
- D. maltosio

172) Un bambino affetto da anemia falciforme deve evitare:

- A. i lunghi soggiorni al mare
- B. le ascensioni in alta montagna
- C. assunzione acido folico
- D. assunzione vitamina E

173) Le sindromi talassemiche sono caratterizzate da:

- A. ridotto volume eritrocitario
- B. aumentato volume eritrocitario
- C. normale volume eritrocitario
- D. nessuna delle precedenti

174) Il sintomo dominante della stenosi ipertrofica del piloro è:

- A. la diarrea
- B. vomito
- C. nausea
- D. stipsi

175) Come deve essere praticata la foto terapia:

- A. esponendo il bambino vestito alla luce di lampade fluorescenti a luce blu
- B. le risposte a e c sono entrambe false
- C. esponendo il bambino nudo senza particolari protezione alla luce di lampade fluorescenti a luce blu
- D. esponendo il bambino nudo con occhi protetti da una benda opaca alla luce di lampade fluorescenti a luce blu e somministrandogli spesso liquidi

176) Per lo screening neonatale di quale delle seguenti patologie viene utilizzato il test di Guthrie:

- A. ipotiroidismo congenito
- B. fibrosi cistica
- C. le risposte a e b sono entrambe vere
- D. fenilchetonuria

177) L'assistenza infermieristica ad un bambino affetto da labbro leporino e palatoschisi deve mirare a:

A. Garantire adeguata nutrizione e idratazione

B. Prevenire la polmonite ab ingestis

C. Tutte le precedenti

D. Nessuna delle precedenti

178) Per somministrare 125 mg di antibiotico per via intramuscolare ad un bambino, in presenza di una fiala da 4 mg contenente 500 mg di farmaco, si dovrà aspirare:

A. 1ml di antibiotico

B. 1,3ml di antibiotico

C. 5ml di antibiotico

D. 0,5ml di antibiotico

179) In gastroenterite acuta nel bambino non è indicato:

A. effettuare bilancio entrate-uscite

B. c+d

C. somministrare cibi ricchi in zuccheri

D. applicare creme di protezione contro la macerazione

180) Quale punto di repere come polso centrale risulta di prima scelta per la valutazione della funzione cardiocircolatoria nel lattante?

A. Carotideo

B. Brachiale

C. Radiale

D. femorale

181) Quale di queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica?

A. Gastroenterite

B. Pancreatite

C. epatite

D. Sindrome nefrosica

182) In età pediatrica il farmaco antipiretico di prima scelta è:

A. paracetamolo

B. lidocaina

C. aspirina

D. ibuprofene

183) Quale tipo di shock è più frequente in età pediatrica :

A. Cardiogeno

B. C+d

C. dissociativo

D. ipovolemico

184) I segni di ipoperfusione periferica nel bambino sono :

- A. cute pallida e estremità fredde
- B. oliguria
- C. tutte le precedenti

185) Il rachitismo è una malattia dovuta a :

- A. carenza vitamina D
- B. carenza acido folico
- C. carenza vitamina C
- D. carenza di elettroliti

186) Quale tra questi riflessi oltre 24 mesi di età è sinonimo di segno patologico ?

- A. Riflesso di moro
- B. C+d
- C. Riflesso di Babinski
- D. Riflesso di Rooting

187) Quale tra queste patologie viene riconosciuta mediante screening neonatale?

- A. Ipotiroidismo congenito
- B. Fenilchetonuria
- C. Tutte le precedenti
- D. A e b sono false

188) In età pediatrica i valori considerati normali della pressione intracranica sono:

- A. 13-18 mmhg
- B. 1-5 mmhg
- C. 1-6mmHg
- D. 5-8 mmhg

189) Che cosa è il kernittero ?

- A. Cheratosi attinica
- B. Ittero gravidico
- C. Aumento bilirubina diretta
- D. Encefalopatia bilirubinica

190) Quando è previsto l'inizio della vaccinazione?

- A. Al primo mese
- B. Al sesto mese
- C. Al primo anno
- D. Al terzo mese

191) Quale è il sito di iniezione più indicato nei bambini al di sotto dei 3 anni ?

- A. Regione deltoidea
- B. Regione ventroglutea
- C. A+b

D. Quadricipite femorale

192) Quando avviene l'emissione di meconio?

A. Entro 12h dalla nascita

B. Dopo 12h dalla nascita

C. Dopo 36h dalla nascita

D. Dopo 24h dalla nascita

193) Di quanti denti si compone la dentizione decidua?

A. 10

B. 36

C. 8

D. 20

194) Il mugugno è ?

A. Una candidosi orofaringea

B. Una congiuntivite

C. Un eritema cutaneo

D. Una rinite allergica

195) Quale tra le seguenti è la vasculite più comune del bambino?

A. Porpora di Schonlein-henoch

B. Malattia di Kawasaki

C. Trisomia 21

D. Trisomia 18

196) Che cosa è l'onfalite ?

A. Un'infezione dell'orecchio

B. Un'infezione del naso

C. Un'infezione dell'occhio

D. Un'infezione Del tralcio ombelicale

197) Cosa è in grado di riconoscere lo scotch test ?

A. Ossiuriasi

B. Salmonella

C. diabete

D. Diabete mellito

198) Da che cosa è caratterizzato il coma chetoacidotico ?

A. Iperglicemia e poliuria

B. Glicosuria e chetonuria

C. A+b

D. Tutte le precedenti

199) Quale fra le seguenti patologie respiratorie è tipica del bambino prematuro ?

A. Sindrome da aspirazione da meconio

B. Rds (respiratory distress sindrom)

C. Bronchite

D. broncopolmonite

200) Qual è il periodo più idoneo per eseguire il prelievo dei villi coriali?

A. Tra 4 e 6 settimana di gestazione

B. Tra 5 e 9 settimana di gestazione

C. Tra 6 e 9 settimana di gestazione

D. Tra 9 e 12 settimana di gestazione

201) Durante il travaglio di parto il segmento uterino inferiore :

A. si contrae

B. si incista

C. si ritrae

D. si espande

202) Nel ciclo mestruale partendo dal primo giorno di mestruazione si distinguono tre fasi; indicare quale tra le seguenti alternative le riporta nell'ordine corretto:

A. luteale, ovulatoria, follicolare

B. ovulatoria, luteale, follicolare

C. a+b

D. follicolare, ovulatoria, luteale

203) L'espulsione degli annessi fetali dopo il parto avviene di norma entro :

A. 2-3 minuti

B. 10 minuti

C. 60 min

D. 15-30 minuti

204) I difetti del tubo neurale nel feto possono essere attribuiti a :

A. carenza di ferro

B. carenza vitamina c

C. carenza di vitamina A

D. carenza di acido folico

205) In quale zona può avvenire l'impianto di una gravidanza extrauterina?

A. Tube di falloppio

B. Addome

C. Fuori dalla cavità uterina

D. Tutte le precedenti

206) Quale dei seguenti segni non è indicativo di una sindrome HELPP, complicanze della gravidanza?

A. emolisi

B. diminuzione calcemia

- C. aumento degli enzimi epatici
- D. aumento della sodiemia

207) Quante tuniche si distinguono nella struttura dell'utero?

- A. 3 (mucosa, muscolare e sierosa)
- B. 2 (sierosa e muscolare)
- C. Sono tutte vere tranne la d
- D. 2 (mucosa e muscolare)

208) La metrorragia è:

- A. l'assenza del flusso mestruale
- B. una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale
- C. un flusso mestruale particolarmente abbondante a comparsa ciclica regolare
- D. nessuna delle precedenti

209) Al di sotto di quale settimana gestazionale si può definire un bambino pretermine ?

- A. 32esima settimana
- B. 40 esima settimana
- C. 39 esima settimana
- D. 37esima settimana

210) La lussazione congenita dell'anca è più comune nei bambini :

- A. di sesso maschile
- B. di entrambi i sessi
- C. di sesso femminile
- D. nati in presentazione cefalica

211) Quali sono i segni clinici che vengono valutati nel neonato per stabilire l'indice di Apgar ?

- A. Colorito cutaneo, pianto vigoro, tono muscolare
- B. C+d
- C. Colorito cutaneo, attività cardiaca, tono muscolare, attività respiratoria, eccitabilità dei riflessi
- D. Colorito cutaneo, attività cardiaca, attività respiratoria, pressione arteriosa

212) Viene definito puerperio il periodo :

- A. compreso tra la fine dell'espulsione del feto e la ripresa dell'attività ciclica-ovarica
- B. compreso tra la fine del parto e la ripresa dell'attività ciclica-ovarica
- C. che comprende le due settimane dopo il parto
- D. tutte le risposte sono corrette tranne la d

213) L'utero è vascolarizzato principalmente :

- A. arteria ovarica

B. arteria ombelicale

C. arteria uterina

D. arteria del legamento rotondo

214) La vulva è l'insieme :

A. di tutti gli organi dell'apparato riproduttivo della donna

B. degli organi genitali esterni della donna

C. degli organi interni dell'apparato riproduttivo della donna

D. tutte le precedenti

215) Le trombe uterine (di falloppio) sono :

A. 3 legamenti utero ovarici

B. Tutte le successive

C. 2 canali muscolari a forma circolare

D. 2 canali muscolari a forma di tromba

216) Le ghiandole di bartolino poste lateralmente al vestibolo vaginale producono :

A. muco

B. enzimi

C. ormoni

D. vitamine

217) Una donna affetta da tubercolosi in fase attiva può allattare:

A. sempre

B. solo in alcuni casi

C. dipende dal caso

D. mai

218) Si definisce retroversione uterina :

A. la deviazione all'indietro dell'intero utero senza modificazione nel rapporto del corpo con il corpo

B. la curvatura verso l'indietro del corpo sul collo dell'utero a livello dell'istmo

C. a+b

D. la caduta all'indietro del collo dell'utero e dell'apice vaginale verso il coccige

219) L'endometriosi è:

A. un 'infezione dell'endometrio

B. una localizzazione ectopica del tessuto endometriale

C. un aumento di volume dell'endometrio

D. nessuna delle precedenti

220) Prima di sottoporsi ad un pap test la donna deve sapere che :

A. l'esame va eseguito a metà del suo ciclo mestruale

B. non si devono avere rapporti sessuali nelle 24h che precedono l'esame

C. non si devono avere rapporti sessuali nelle 24h che seguono l'esame

D. tutte le precedenti

221) Quale tra i sintomi può essere causato dalla vaginite:

- A. febbre
- B. stranguria
- C. oliguria
- D. prurito

222) Quale tra le seguenti patologie non può essere trasmessa per via sessuale:

- A. sifilide
- B. gonorrea
- C. amenorrea
- D. carcinoma della vulva

223) Quale tra i seguenti ormoni non è prodotto dall'ovaio:

- A. Progesterone
- B. estradiolo
- C. ormone follicolo stimolante
- D. estrogeni

224) La prima mestruazione si definisce :

- A. pubarca
- B. menarca
- C. telarca
- D. nessuna delle precedenti

225) Quale tra le seguenti rappresenta un caso di sterilità secondaria:

- A. una coppia in cui non si è mai verificato alcun concepimento dopo almeno due anni di rapporti non protetti
- B. sono tutte false tranne la c
- C. una coppia in cui si sono verificati più concepimenti esitati tutti in aborti spontanei
- D. una coppia in cui si è già verificato un concepimento esitato in un parto a termine e non se ne verificano altri dopo almeno due anni di rapporti sessuali non protetti

226) Come si definisce una ragade ?

- A. Soluzione di continuo della cute disposta radialmente rispetto ad un orifizio
- B. Lacerazione del perineo in seguito a un parto spontaneo
- C. Tutte le precedenti
- D. Ulcerazione presente sulla cute di una mammella

227) L'unione della cellula uovo allo spermatozoo fecondante avviene :

- A. nel canale cervicale
- B. nella cavità uterina

C. a+b

D. a livello della giunzione istmo ampollare della tuba uterina

228) Qual è la funzione propria della placenta?

A. Nutritiva

B. Protettiva

C. endocrina

D. Tutte le precedenti

229) L'età gestazionale :

A. è sinonimo di età concezionale

B. si calcola dal primo giorno dell'ultima mestruazione

C. si calcola dall'ultimo giorno dell'ultima mestruazione

D. nessuna delle precedenti

230) Quale di questi annessi embrio fetali è ritenuto il più importante:

A. funicolo ombelicale

B. placenta

C. liquido amniotico

D. sacco vitellino

231) Qual è l'esatto ordine del decorso clinico del parto?

A. Dilatante, secondamento, prodromico, espulsivo

B. C+d

C. Prodromico, secondamento, dilatante, espulsivo

D. Prodromico, dilatante, espulsivo, secondamento

232) Da cosa è caratterizzata la gestosi?

A. Edemi, proteinuria, ipertensione

B. Cefalea, vomito, dissenteria

C. A+b

D. Edemi, proteinuria, ipotensione

233) Da chi viene prodotto il progesterone?

A. Tube

B. Corpo albicante

C. Corpo luteo

D. endometrio

234) Quale di questi ormoni è utile ai fini di test diagnostici per individuare una possibile gravidanza?

A. Ossitocina

B. Gonadotropina corionica umana

C. Corticotropina

D. tiroxina

- 235) Quali di queste infezioni di interesse ginecologico/ostetrico è causato da protozoi?
- A. Sifilide
 - B. Tubercolosi
 - C. polmonite
 - D. Toxoplasmosi
- 236) Come si chiama la prima metà del ciclo ovarico?
- A. Fase luteale
 - B. A+c
 - C. Ovulazione
 - D. Fase follicolare
- 237) L'ingorgo materno è caratterizzato da :
- A. iperemia e tensione dolorosa
 - B. iperemia e astenia
 - C. iperemia e cachessia
 - D. nessuna delle precedenti
- 238) Si definisce curettage :
- A. la dilatazione del canale cervicale
 - B. la medicazione della cervice
 - C. a+b
 - D. l'asportazione dell'endometrio uterino
- 239) Quale delle seguenti è il test di screening secondario per le neoplasie del collo dell'utero :
- A. colposcopia
 - B. biopsia
 - C. colonscopia
 - D. pap test
- 240) Durante il travaglio, per essere considerata normale, la frequenza cardiaca basale del feto deve essere:
- A. tra 60 e 120 battiti per minuto
 - B. tutte le successive
 - C. tra 160 e 200 battiti per minuto
 - D. tra 120 e 160 battiti per minuto
- 241) I segni obbiettivi più importanti per la diagnosi di travaglio sono :
- A. perdite genitali di muco, contrazioni uterine, modificazioni collo dell'utero
 - B. contrazioni uterine, ematuria, glicosuria
 - C. modificazioni del collo dell'utero, perdite genitali di muco
 - D. b+c

- 242) Si parla di polimenorrea quando :
- A. l'intervallo tra due cicli mestruali è inferiore a 25 giorni
 - B. l'intervallo tra due cicli mestruali supera i 36 giorni
 - C. assenza del fenomeno mestruale
 - D. b+c
- 243) La laparoscopia diagnostica/operativa è indicata in caso di :
- A. fibroma
 - B. endometriosi
 - C. tutte le precedenti
 - D. nessuna delle precedenti
- 244) La blenorragia è causata da:
- A. emorragia dell'utero
 - B. gonococco
 - C. epatite B
 - D. epatite A
- 245) Qual è il trattamento per la candidosi :
- A. Antivirali
 - B. Immunosoppressori
 - C. antibiotici
 - D. antimicotici
- 246) Un parto viene definito distocico se:
- A. il travaglio di parto viene indotto artificialmente
 - B. c+d
 - C. viene espletato mediante intervento chirurgico
 - D. intervengono ostacoli o complicazioni per partoriente e/o il feto
- 247) Una donna che ha partorito da non oltre 6 settimane viene definita:
- A. gravida
 - B. partoriente
 - C. gestante
 - D. puerpera
- 248) Quale tra le seguenti è la principale controindicazione all'allattamento al seno?
- A. HIV
 - B. HCV
 - C. Galattosemia nel neonato
 - D. Tutte le precedenti
- 249) Quale dei seguenti farmaci è da evitare in gravidanza?
- A. Acido valproico

- B. Amoxicillina
- C. Acido folico
- D. Vitamina A

250) Per quanto tempo bisogna medicare il cordone ombelicale dopo la nascita ?

- A. 24h
- B. Una settimana
- C. Non bisogna medicare
- D. Fino alla caduta del moncone